

## **Hilissuvised tööd mesilas. Täiendussöötmine. Pesade koondamine. Varguste vältimine**

**Kokkuvõtte loengust Elvas 15. augustil 2009.a.**

**Lektor Tõnu Hiimäe, lektorileping PR-5-1.5-71**

### **Mesindusloeng toimus Eesti mesindusprogrammi raames, mida toetab Euroopa Liit**

Praegu on meevurritamise aeg, sest tarukaal näitab, et suurt korjet loodusest enam pole. Mett võttes tuleb jälgida, et mesilaspere ei jääks ilma valgusöödata. Täiskasvanud mesilased talvel tavaliselt suira ei tarvita, sest saavad oma valguvajaduse mees leiduvast õietolmust. Suir on aga hädavajalik varakevadel, kui pere hakkab hauet kasvatama. Suiru puudus pesas põhjustab haudmetegevuse hilinemist, noseema eoste levimist ning on meelepärane varroalestale.

Toitevarust võiks olla umbes 50% naturaalmett ja 50% suhkrusiirupit. Viimane jätab mesilastel vähem seedejääke, mis väldib mesilaste liiga varajast väljakippumist ja hukkumist.

Enam meega täidetud kärjed paigutada pesa äärepoole. Keskele jätta tühjemad, kuhu läheb täiendussööt. Täiendussöödale lisada veidi sidrunhapet või õunaäädikat, et sööt nii kergesti ei kristalliseeruks. Lisada ka veidi koirohudinktuuri kõhulahtisuse vastu.

Talvepessa jäävate raamide arv on vastavalt pere tugevuse järgi 6 – 10 raami.

Kõige paremini talvituvad augusti lõpus ja septembri esimeses pooles koorunud mesilased.

Peale meevõttu võib alustada varroalesta tõrjet.

Emad koos talvepessa minevate sobivate kärgedega eraldada lamavtarus lennuava poolsesse ossa.

Varguse vältimiseks on kõige soodsam, kui alustatakse koondamist siis kui korje loodusest ei ole veel päriselt lõppenud. Vargus ei teki ka kui peresid koondada ja mett võtta varastel hommikutundidel-(kella 7. ja 10. vahel). Samuti ei ole soovitatav tühjaksvurritatud kärgi ja inventari jätta tarude ligidusse mesilastele puhastamiseks.

Ka lennuavad tuleb tõmmata koomale.

Nüüd on paras aeg hakata kärgi sorteerima ja mittekõlblikke vahaks sulatama.

Tõnu Hiimäe.